AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION DES PAYS DE LA LOIRE ANGERS

Tél. 88.56.15
88.06.15

ABONNEMENT ANNUEL
30 Frs

(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, VENDÉE, MAYENNE)

Régisseur de recettes de la D.D.A. - Protection des Végétaux-Cité Administrative rue Dupetit-Thouars - 49043 ANGERS CEDEX

C. C. P. Nantes 86-04-02

VIGNE

MILDIOU

- Vignobles de la Loire Atlantique et de Muscadet de Maine-et-Loire - Quelques rares taches apparaissent sur une végétation non protégée; en conséquence, pour éviter la dissémination tardive de la maladie, effectuer un nouveau traitement.

- Autres vignobles - Les taches demeurent extrêmement rares et l'état sanitaire de l'ensemble du vignoble est très correct. Toutefois, très localement quelques foyers sont apparus. Par conséquent:
Dans les parcelles où des foyers auront été décelés et dans les parcelles situées à proximité immédiate de ces foyers, un nouveau traitement pourra être effectué dès maintenant. Par contre, dans les parcelles,qui constituent la grande majorité du vignoble, dans lesquelles la maladie n'a pas été décelée, on peut encore attendre pour effectuer un traitement d'aoûtement. La Station donnera en temps utile de nouvelles informations.

VERS DE LA GRAPPE -

- Vignobles de la Loire Atlantique et de Muscadet de Maine-et-Loire - Les pontes de cochylis et d'eudémis sont dans l'ensemble peu importantes et n'arriveront à éclosion qu'à la fin de la semaine en cours. En conséquence,un traitement dans les parcelles régulièrement attaquées, peut être effectué dans les premiers jours de la semaine du 5 au 11 Août. Avant d'intervenir, on peut déceler les premières piqûres qui pourront être visibles au milieu de la semaine du 5 au 10 Août.
- Vignobles des coteaux de la Loire, du Layon et de l'Aubance - La situation est identique à celle qui existe dans les vignobles de Muscadet de la Loire Atlantique. Surveiller de préférence les zones régulièrement attaquées par l'eudémis.
- Vignobles du Haut Layon et du Saumurois - Les attaques demeurent très localisées. Dans la plupart des parcelles, aucun traitement ne se justifie. Par contre, localement, dans les secteurs habituellement infestés, des oeufs de cochylis, parfois nombreux, ont été déposés. Ils arrivent actuellement à éclosion. Dans ces secteurs, un traitement immédiat pourra être exécuté.

/REMARQUE/ - Les viticulteurs qui disposent de pièges alimentaires pour les vers de la grappe ne doivent pas se laisser impressionner par les captures très importantes de papillons qui sont liées aux conditions climatiques actuelles, en particulier à la sécheresse. Ces captures n'impliquent pas forcément un risque d'attaque élevé.

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES - Dans la Vallée de la Loire, le deuxième vol est sur le point de commencer. Toutefois, il est encore trop tôt pour intervenir. La Station donnera, en temps utile, de nouvelles informations.

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire des "PAYS DE LA LOIRE"

J. DIXMERAS

Les Ingénieurs chargés des Avertissements Agricoles:

R. GEOFFRION - J. BOUCHET

TIRAGE DU 31 JUILLET 1974

29

Imprimerie de la Station d'Angers • Directeur-Gérant. L. BOUYX